

インフルエンザワクチンチェックシート

- ワクチンを打ってもかかってしまう場合がありますが、かかりにくくし、重症化を防ぐ効果は期待されています。
- 13歳未満は2回接種が原則ですが、3歳以上は1回接種と2回接種で大きな違いはありません。前年接種した場合、米国などでは1回接種です。
- 2回目は1回目から3週間以上あけてください。
- ワクチンの効果はおおよそ5か月とされています。
- 卵アレルギーのある方は医師に相談してください。
- 一般に副反応は局所反応（はれやしこり）と微熱程度です。
重大な反応は30分以内がほとんどです。30分は院内でお待ちください。
- 今晚入浴はかまいません。激しい運動と大量の飲酒はお控えください。
- ご高齢の方は肺炎球菌ワクチン接種の併用をお勧めいたします（5年に1回）。

接種者氏名 _____

-----きりとり-----

（患者様お持ち帰り用控え）

- ワクチンを打ってもかかってしまう場合がありますが、かかりにくくし、重症化を防ぐ効果は期待されています。
- 13歳未満は2回接種が原則ですが、3歳以上は1回接種と2回接種で大きな違いはありません。前年接種した場合、米国などでは1回接種です。
- 2回目は1回目から3週間以上あけてください。
- ワクチンの効果はおおよそ5か月とされています。
- 卵アレルギーのある方は医師に相談してください。
- 一般に副反応は局所反応（はれやしこり）と微熱程度です。
- 重大な反応は30分以内がほとんどです。30分は院内でお待ちください。
- 今晚入浴はかまいません。激しい運動と大量の飲酒はお控えください。
- ご高齢の方は肺炎球菌ワクチン接種の併用をお勧めいたします（5年に1回）